



Tema 1: Salud, derechos sexuales y reproductivos

El acceso a servicios de salud sexual y reproductiva es aún muy limitado en nuestro país. Sumado a ello, se debe señalar que existe una infrarrepresentación de la problemática real debido a que muchos casos no son registrados porque las menores se atienden en casa o tienen dificultades al momento de acercarse a un establecimiento de salud. Así que esta problemática debe comprenderse con la complejidad necesaria, ya que no todas las personas pueden acceder a los servicios de salud por factores como el lugar de residencia, entre otros.

Acceso a métodos anticonceptivos y anticoncepción oral de emergencia (AOE): el derecho a decidir sobre la vida reproductiva

- La Tasa Global de Fecundidad deseada en el país hubiera sido de 1.5 hijos en promedio por mujer, si todos los nacimientos no deseados hubieran podido ser prevenidos. Como esto no ocurrió, la Tasa Global de Fecundidad observada fue de 2.0¹.
- Las mujeres tienen en promedio 2.2 hijos, y se presentan diferencias según el nivel educativo (3.5 sin educación y 1.7 educación superior) y la región natural (1.7 en Lima Metropolitana y 2.9 en la Selva)².
- El 61,2% de las mujeres unidas, casadas y convivientes, no desean tener más hijas y/o hijos³.
- Alrededor del 24% de mujeres unidas entre 15 a 49 años de edad no utilizan ningún método anticonceptivo. Entre quienes sí los utilizan, el 20.3% emplean algún método tradicional (método del ritmo, entre otros)⁴.
- El mayor proveedor de métodos anticonceptivos modernos en el país es el sector público (52.3%) seguido de las farmacias/boticas (39.0%)⁵.
- En el contexto de la pandemia por la COVID-19⁶:
 - Decrecimiento del 20% en el número de parejas protegidas de planificación familiar en todos los grupos etarios si se compara al 2019, situación que se agrava en adolescentes.

1 Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2019 https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Endes2019/

2 Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2019 https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Endes2019/

3 Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2019 https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Endes2019/

4 Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2019 https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Endes2019/

5 Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2019 https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Endes2019/

6 Informe de la situación del acceso a los servicios de Salud Sexual y Reproductiva en tiempos de pandemia <https://promsex.org/wp-content/uploads/2020/11/SALUD-SEXUAL-Y-REPRODUCTIVA.pdf>

- Para el 2021, se estima que habrá un incremento en 1.4% de las necesidades insatisfechas de planificación familiar con métodos modernos respecto al año previo, lo cual implica un retroceso de por lo menos cinco años en este indicador.
- Se presentó un limitado acceso a los kits de emergencia para víctimas de violación sexual. Menos de la mitad de las adolescentes y mujeres recibieron estos kits debido a trabas impuestas por el personal de salud⁷.

Acceso al control prenatal y la atención de parto: maternidades saludables y seguras

- La proporción de partos institucionales en el año 2019 fue 92.4%. Por ámbito geográfico se observa una diferencia de 15.5% entre el área urbana y rural (96.3% frente a 80.8%)⁸.
- En el Instituto Materno Perinatal (Ex Maternidad de Lima), entre mayo y septiembre del 2020 se atendieron 5596 teleconsultas y 638 consultas presenciales. Sin embargo, no existe información que demuestre el uso extendido de la telemedicina para brindar la atención prenatal a las gestantes en el período de la primera cuarentena⁹.

Mortalidad materna: las muertes prevenibles

- Durante el 2020, se reportaron 429 muertes maternas; mientras que el 2019, se registraron 302 muertes; representando un aumento del 42%¹⁰.
- Las principales causas directas de mortalidad materna constituyeron el 55.7% de los casos en el 2020 siendo la primera los trastornos hipertensivos (21.5%), seguida por la hemorragia obstétrica (18.5%). Es preciso resaltar que también se encuentran la infección obstétrica/sepsis (3,6%) y el aborto y sus complicaciones (2%).

Las causas indirectas constituyeron el 44.3% de los casos entre las que destaca la principal causa: enfermedad por COVID-19 (15,4%)¹¹.

7 Wayka 2020, "De 786 víctimas de violación, menos de la mitad recibió el 'kit' que previene embarazo"

<https://wayka.pe/de-786-victimas-de-violacion-menos-de-la-mitad-recibio-el-kit-que-previene-embarazo/>

8 Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2019 https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Endes2019/

9 Instituto Nacional Materno Perinatal (Ex – Maternidad de Lima) <https://investigacionmaternoperinatal.inmp.gob.pe/index.php/rpinmp/issue/view/17/17>

10 Boletín Epidemiológico del Perú 2020. Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades.

En: https://www.dge.gob.pe/epipublic/uploads/boletin/boletin_202053.pdf

11 Boletín Epidemiológico del Perú 2020. Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades.

En: https://www.dge.gob.pe/epipublic/uploads/boletin/boletin_202053.pdf

Acceso al Aborto terapéutico: atención preventiva para cuidar la salud y vida de las mujeres

- Decrecimiento en atención de abortos terapéuticos en el 2020 frente al año anterior¹² a pesar de que durante el 2020 la muerte materna se incrementó un 42% en relación al año 2019.
- Las muertes indirectas- que constituyeron el 44.3%- pudieron prevenirse si las mujeres hubieran tenido acceso a un aborto terapéutico.
- En los principales hospitales de referencia a nivel nacional, se reportaron 141 abortos terapéuticos en el año 2019, en el 2020 esta cifra disminuyó en un 63%¹³.



Frente a esta realidad, ¿cuáles son las propuestas de las organizaciones políticas que aspiran a llegar a la Presidencia y el Congreso del Perú?

¹² Durante pandemia del COVID-19: El embarazo adolescente se incrementó en 12 por ciento.

<http://www.spog.org.pe/web/index.php/noticias-spog/514-durante-pandemia-del-covid-19-el-embarazo-adolescente-se-incremento-en-12-por-ciento>

¹³ Informe de la situación del acceso a los servicios de Salud Sexual y Reproductiva durante la pandemia del COVID - 19 en el Perú

<https://promsex.org/wp-content/uploads/2020/11/SALUD-SEXUAL-Y-REPRODUCTIVA.pdf>